

१८. विविध रेचकांविषयी माहिती

(पचन संस्थेचे साधे आजार)

नाव	कसे काम करते	किती वेळात परिणाम	प्रौढांसाठी डोस
१.त्रिफळा चूर्ण	आतड्यात पाणी शोषून फुगते आणि त्यामुळे पुढेपुढे ढकलले जाते	६-८ तास	रात्री १-२ मोठे चमचे गरम पाण्याबरोबर घ्यावे.
२.सेन्ना	मोठ्या आतड्याला चालना देते	६-८ तास	पाण्याबरोबर १-२ गोळ्या
३.एरंडेल तेल	आतड्यांना जास्त जुलाब होतात	३-६ तास	३० मि.ली.(बाळांना आणि गरोदर स्त्रियांना देऊ नये)
४.मॅग्नेशियम सल्फेट	रक्तातून आतड्यात पाणी खेचते, त्यामुळे मळ पातळ व जास्त होतो, एक किंवा दोन मोठे जुलाब होतात. (मूत्रपिंडविकारात देऊ नये)	३-६ तास	५-१५ गॅम, १ ग्लास पाण्याबरोबर (याएवजी २० मि.ली मिळक आॅफ मॅग्नेशिया चालेल.
५.बिसकोडील (डल्कोलॅक्स)	मोठ्या आतड्यास चालना देते. १-२ मोठे जुलाब होतात.	तौडाने दिल्यास ८ तासात, गुदद्वाराने दिल्यास १५ मिनिटात	१ गोळी तौडाने (५ मि.ग्रॅ) पाण्याबरोबर किंवा १० मिग्रॅ. ची गुदद्वार गोळी.
६.पॅराफिन	(पातळ)आतड्यांना वंगण होते, मळ मऱ्य होतो व सरकतो (पॅराफिन पचत नाही)	६-८ तास	१०-३० मिली झोपताना. (मुलांना नकोच, मोठ्यांनाही वारंवार नको).
७.गोडतेल किंवा खोबरेल तेल	पॅराफिनप्रमाणेच काम करते, मात्र काही भाग पचतो, त्यामुळे डोस जास्त द्यायला लागतो.	६-८ तास	३०-५०मि.ली. झोपताना
८.इसबगोल.	पाण्याने फुगते, त्यामुळे ढकलले जाते. सबजापण असेच काम करतो.	१२-३६ तास	५-१५ गॅम कोमट पाण्याबरोबर
९. मिलिसरिन	मळ मऱ्य करते	१ तासात	गुदद्वारातून पिचकारी किंवा गोळी रुपात घालावे.
टीप १. लहान बाळांना रेचकाची गरज नसते, एरंडेल तर नकोच नको. वाटल्यास गुदद्वारामार्फत तेल/पॅराफिन/मिलिसरिन द्यावे.			
२. जंतासाठी औषधे देताना रेचकाची गरज नसते.			
३. एनिमासाठी तयार पॅक मिळतात.			